



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE ODONTOLOGÍA**

TEMA:

**Nivel de satisfacción en pacientes portadores de prótesis parcial
removible**

AUTORA:

Valarezo Orellana, Tábata Paulette

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
ODONTÓLOGA**

TUTORA:

Ocampo Poma, Estefanía del Rocío

Guayaquil – Ecuador

11 de septiembre del 2024



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por **Valarezo Orellana, Tábata Paulette**, como requerimiento para la obtención del título de **Odontóloga**.

TUTORA

f. _____

Ocampo Poma, Estefanía del Rocío

DIRECTORA DE LA CARRERA

f. _____

Dra. Andrea Cecilia Bermúdez Velásquez

Guayaquil, a los 11 días del mes de septiembre del año 2024



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Valarezo Orellana, Tábata Paulette**

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, **Nivel de satisfacción en pacientes portadores de prótesis parcial removible** previo a la obtención del título de **Odontóloga**, ha sido desarrollado respetando los derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías.

Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 11 días del mes de septiembre del año 2024

LA AUTORA

Tábata Valarezo

f. _____

Valarezo Orellana, Tábata Paulette



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

AUTORIZACIÓN

Yo, **Valarezo Orellana, Tábata Paulette**

Autorizo a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil a la publicación en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, **Nivel de satisfacción en pacientes portadores de prótesis parcial removible**, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 02 del mes de septiembre del año 2024

LA AUTORA

Tábata Valarezo

f. _____

Valarezo Orellana, Tábata Paulette

REPORTE DE COMPILATIO

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
----	---------------	-------------	-------------	-------------------



INFORME DE ANÁLISIS
magister

TABATA PAULETTE VALAREZO ORELLANA

0%
Textos
sospechosos

6% Similitudes (Ignorado)
< 1% similitudes entre
comillas
0% entre las fuentes
mencionadas
3% Idiomas no reconocidos
(Ignorado)

Nombre del documento: TABATA PAULETTE VALAREZO ORELLANA.docx
ID del documento: ad3b085a5460f3329d10587f3a4b475a48b1cb9d
Tamaño del documento original: 34,17 kB
Autores: []

Depositante: Estefanía del Rocío Ocampo Poma
Fecha de depósito: 24/8/2024
Tipo de carga: interface
fecha de fin de análisis: 24/8/2024

Número de palabras: 4367
Número de caracteres: 28.010

Ubicación de las similitudes en el documento:



Fuentes de similitudes

Fuentes principales detectadas

www.elsevier.es | Rendimiento masticatorio y nivel de satisfacción de pacientes tr...

TUTORA

f. _____

Ocampo Poma, Estefanía Del Rocío

AGRADECIMIENTO

Ha sido una etapa maravillosa y quiero extender mi agradecimiento a las personas que caminaron junto a mí este proceso, a mis padres, mi hermana, mis sobrinos, mis abuelos, mi prometido, a mis maestros

DEDICATORIA

Esta tesis va dedicada a Dios, a mis padres, a mi prometido, a todo mi familia, gracias por su apoyo incondicional.



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____
Dra. Andrea Bermudez
DIRECTORA DE LA CARRERA

f. _____
Dra. Estefania Ocampo
COORDINADOR DEL ÁREA

f. _____
Dra. Andrea Bermudez
OPONENTE

RESUMEN

Introducción: Las prótesis parciales removibles son tratamientos específicos que sirven para la rehabilitación de pacientes con edentulismo parcial, estas pueden ocasionar dolor, problemas psicosociales, disminución de la función masticatoria y fonética generando el rechazo de los pacientes. El nivel de satisfacción se refiere al nivel de complacencia de pacientes portadores de prótesis dental y se encuentra asociado a la capacidad del paciente para adaptarse a la prótesis dental. **Objetivo:** Determinar el nivel de satisfacción en pacientes portadores de prótesis parcial removible en la clínica odontológica de la UCSG periodo A-2024. **Materiales y métodos:** Se realizó un estudio de tipo cuali-cuantitativa, de diseño no experimental, longitudinal y descriptivo, con una muestra de 34 pacientes portadores de prótesis parcial removible bimaxilar o monomaxilar, en un rango de edad de 20 años a 75 años, tanto de género masculino y femenino antes del uso de la PPR y 6 meses después del uso de la PPR. La encuesta de GOHAI fue el instrumento utilizado para determinar el nivel de satisfacción, donde evalúa las dimensiones: físicas, fonéticas, psicosociales y problemas de dolor e incomodidad en sus 12 preguntas, las cuales fueron medidas por el índice tipo Likert. **Resultados:** Los pacientes más jóvenes portadores de PPR monomaxilares, obtuvieron un nivel de satisfacción alto antes y después.

Conclusiones: Los pacientes antes del uso de la PPR resultaron tener un nivel de satisfacción alto, después de los 6 meses del uso de la PPR resultaron tener un nivel de satisfacción muy alto.

Palabras claves: nivel de satisfacción, prótesis parcial removible, dimensión física, fonética, problemas psicosociales, dolor, monomaxilar

ABSTRACT

Introduction: Removable partial prostheses are specific treatments that serve for the rehabilitation of patients with partial edentulism. These can cause pain, psychosocial problems, decreased masticatory and phonetic function, generating patient rejection. The level of satisfaction refers to the level of complacency of patients wearing dental prostheses and is associated with the patient's ability to adapt to the dental prosthesis.

Objective: Determine the level of satisfaction in patients with removable partial dentures in the UCSG dental clinic period A-2024. **Materials and methods:** A qualitative-quantitative study, with a non-experimental, longitudinal and descriptive design, was carried out with a sample of 34 patients with bimaxillary or monomaxillary removable partial prosthesis, in an age range from 20 years to 75 years. both male and female gender before the use of PPR and 6 months after the use of PPR. The GOHAI survey was the instrument used to determine the level of satisfaction, where it evaluates the dimensions: physical, phonetic, psychosocial and pain and discomfort problems in its 12 questions, which were measured by the Likert-type index. **Results:** The youngest patients with monomaxillary RPP obtained a high level of satisfaction before and after.

Conclusions: Patients before using PPR turned out to have a high level of satisfaction, after 6 months of using PPR they turned out to have a very high level of satisfaction.

Keywords: *level of satisfaction, removable partial prosthesis, physical dimension, phonetics, psychosocial problems, pain, monoxillary*

INTRODUCCIÓN

Las prótesis dentales son tratamientos específicos que sirven para la rehabilitación de pacientes con edentulismo parcial y total. Estos son dispositivos removibles que transmiten las cargas masticatorias al reborde óseo residual a través de la mucosa masticatoria.¹ En muchos casos las prótesis generan dolor, deficiencia de la función masticatoria y rechazo de los pacientes a corto y mediano plazo debido a la falta de adaptación de las prótesis al reborde alveolar¹.

El nivel de satisfacción se refiere al nivel de complacencia de pacientes portadores de prótesis dental y se encuentra asociado a la comodidad, la eficiencia masticatoria, la estética, retención y la capacidad del paciente para adaptarse a la prótesis dental². Sin embargo, los factores psicológicos están directamente relacionados a la afectación de la calidad de vida y salud oral con los pacientes portadores de prótesis dental en adultos mayores³.

Las investigadoras Atchison y Dolan del departamento de salud pública odontológica de la Universidad de California en los Ángeles (EU), publicaron en el "Journal of Dental Education", luego de varios estudios, el "Geriatric Oral Health Assessment Index" traducido como "Índice de Calidad de Vida Oral en Geriatría" (GOHAI) ó "Índice de Valoración de salud Oral en Geriatría"¹.

La encuesta GOHAI fue diseñada para evaluar los problemas oro-funcionales y medir el impacto psicosocial asociado a los problemas bucodentales, esta herramienta permite medir la efectividad

funcional y psicosocial de un tratamiento bucodental realizado, en una población de adultos mayores¹.

En 1998 Frank et al., realiza una investigación donde establece estadísticamente existe una alta tasa de inconformidad de las prótesis parciales removibles, lo que representa pérdida de tiempo, dinero y desgaste emocional de los pacientes¹. Estudios realizados para la identificación del impacto de la salud oral en la calidad de vida de los adultos mayor en el año 2012 por Diaz, Arrieta y Martinez revelaron que al analizar las dimensiones evaluadas por la encuesta GOHAI, relacionan la salud bucal con la calidad de vida³.

Por otro lado, en el 2015 Mac-Kay et al., manifiesta que el nivel de satisfacción en cuanto a lo funcional es afectada por las alteraciones en el proceso de masticación⁴. También en el 2015, Von demostró mediante la dimensión psicosocial de la encuesta de GOHAI, que un gran número de pacientes satisfechos con su estética, mejoraron sus relaciones sociales después de su tratamiento protésico³.

Es importante que el odontólogo conozca las inconformidades, afectaciones funcionales y el impacto psicosocial relacionado con las prótesis parciales removibles ya que de esta manera podrá establecer métodos óptimos para aumentar la satisfacción del paciente. Por este motivo examinamos la relación entre el grado de satisfacción con la masticación y la función masticatoria subjetiva y objetiva de pacientes que usan prótesis parcial removible² en el presente estudio, que tiene como objetivo determinar el nivel de satisfacción en pacientes portadores de prótesis parcial removible en la clínica

odontológica de la UCSG periodo A-2024.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio fue de tipo cuali-cuantitativa, de diseño no experimental, longitudinal y descriptivo, donde la población estuvo conformada por 67 pacientes que se atendieron en la clínica odontológica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el periodo A-2024, sin embargo, 34 pacientes portadores de prótesis parcial removible bimaxilar o monomaxilar, en un rango de edad de 20 años a 75 años, tanto de género masculino y femenino, conformaron la muestra, los cuales fueron seleccionados bajo los criterios de inclusión:

- Pacientes portadores de prótesis parcial removible que asistieron a la clínica de la UCSG durante el periodo B-2023 y el periodo A-2024
- Pacientes con predisposición a participar en la investigación.
- Pacientes que utilizaron su prótesis continuamente.

La encuesta de GOHAI fue el instrumento utilizado para evaluar el nivel de satisfacción, este cuestionario está compuesto por dos partes, la primera parte conformada por datos generales como; género, fecha, edad y la segunda parte conformada por 12 preguntas, determinando el nivel de satisfacción en las cinco dimensiones de la variable de estudio: función fonética, dieta, estado emocional,

autoestima y dolor, las cuales fueron medidas por el índice de Likert³. El paciente manifestó su nivel de satisfacción mediante ítems, que constan de un valor numérico, como se describe a continuación: totalmente de acuerdo (5 puntos), de acuerdo (4 puntos), indiferente (3 puntos), en desacuerdo (2 puntos), y totalmente en desacuerdo (1 punto). Los puntajes parciales o por dimensión se expresarán como nivel de satisfacción: muy bajo (5 – 7 puntos), bajo (8 – 10 puntos), alto (11 - 13 puntos), y muy alto (14 – 15 puntos). El puntaje total se reflejará como nivel de satisfacción: muy bajo (9 – 17puntos), bajo (18 – 27puntos), alto (28 – 37puntos), y muy alto (38 – 45puntos)³.

El test de GOHAI es una encuesta validada por juicio de expertos con una confiabilidad según alfa de cronbach de 0.863³, los pacientes fueron evaluados antes y después de 6 meses del uso de la prótesis parcial removible.

Los datos adquiridos se introdujeron en una planilla Excel para su análisis estadístico, donde fue realizado aplicando el test de correlación de Pearson.

RESULTADOS

En la tabla 1. se analiza el nivel de satisfacción de pacientes portadores de prótesis parcial removible según su edad, antes y después dando como resultado un valor de – 5.14 y un intervalo de confianza de 3.48.

Tabla 1. Nivel de satisfacción de pacientes portadores de PPR según su edad		
EDAD Antes - Después	Media	Intervalo de confianza
		-5.14706

En la tabla 2. Se observa el nivel de satisfacción de pacientes antes del uso de la prótesis parcial removible, donde encontramos 25 pacientes de género femenino con un valor muy alto de satisfacción (43.64) con una desviación estándar de 1.74 y los 9 pacientes de género masculino (43.00) con una desviación estándar de 1.63. Después del uso de la prótesis parcial removible las pacientes de género femenino presentaron aún más satisfechas con un valor muy alto (49.20) junto a una desviación estándar de 0.77 por otro lado los pacientes de género masculino también aumentaron su nivel de satisfacción (47.00) con una desviación estándar de 0.80. Sin embargo, podemos observar que mayoritariamente los pacientes femeninos indican que se sienten más satisfechos con los resultados obtenidos cuando utilizan sus prótesis (0,013). Por otro lado, los pacientes masculinos (0.009) se encuentran más satisfechos con los resultados obtenidos de su

el 58,8% contestó que «nunca», por lo tanto, un muy alto porcentaje de pacientes

prótesis, pero no tanto como los pacientes femeninos.

Tabla 2. Nivel de satisfacción de pacientes portadores de PPR según género				
	Sexo	N	Media	p
Antes	Femenino	25	43.6400	0.759
	Masculino	9	43.0000	0.763
Después	Femenino	25	49.2000	0.013
	Masculino	9	47.0000	0.009

En la tabla 3. se realiza el análisis de porcentaje por pregunta de la encuesta de GOHAi antes del uso de la prótesis parcial removible dando como resultado que en la pregunta 1 el 55,9% contestó que «nunca», en la 2 pregunta el 41,2% contestó «frecuentemente», en la pregunta 3 el 35,3% contestó que «siempre», en la pregunta 4 el 32,4% contestó que «a veces», por lo tanto, un alto porcentaje indica no tener problemas para tragar los alimentos que ellos comen, sin embargo, al 41,2% a veces tiene problemas al masticar comidas como carnes o manzanas.

Los resultados de la pregunta 6 el 67,6% contestó que «nunca», en la pregunta 7 el 32,4% contestó que «frecuentemente», en la pregunta 9 el 32,4% contestó que «siempre», en la pregunta 10 el 55,9% contestó que «nunca», en la pregunta 11

manifestaron no tener problemas psicosociales, pese a ello un alto porcentaje se encontraron preocupados por su salud bucodental.

Los resultados en la pregunta 5 el 35,3% contestó que «a veces», en la pregunta 8 el 50% contestó que «rara vez» y en la pregunta 12 el 47,1% contestó que «nunca», por lo tanto, la mayoría de pacientes no presentaron problemas de dolor e incomodidad antes de usar la prótesis parcial removible.

Tabla 3. Porcentaje por pregunta de la encuesta GOHAI antes del uso de la PPR						
No.	Pregunta	S	F	AV	RV	N
1	¿Cuántas veces ha tenido que comer menos o cambiar de comida por culpa de sus dientes o de su dentadura?	0	8,8	8,8	26,5	55,9
2	¿Cuántas veces ha tenido problemas al masticar comidas como la carne o las manzanas?	5,9	20,6	41,2	17,6	14,7
3	¿Cuántas veces ha tragado usted bien?	35,3	32,4	14,7	14,7	2,9
4	¿Cuántas veces no ha podido usted hablar bien por culpa de sus dientes o dentadura?	2,9	14,7	32,4	17,6	32,4
5	¿Cuántas veces no ha podido comer las cosas que usted quería sin tener ninguna molestia?	0	14,7	35,3	20,6	29,4
6	¿Cuántas veces no ha querido salir a la calle o hablar con la gente por culpa de sus dientes o dentadura?	0	2,9	14,7	14,7	67,6
7	Cuando usted se mira al espejo, ¿cuántas veces ha estado contento de cómo se ven sus dientes o su dentadura?	17,6	32,4	23,5	23,5	2,9
8	¿Cuántas veces ha tenido que utilizar algún medicamento para aliviar el dolor de sus dientes o las molestias en su boca?	0	0	20,6	50,0	29,4
9	¿Cuántas veces ha estado preocupado o se ha dado cuenta de que sus dientes o su dentadura no están bien?	32,4	23,5	23,5	11,8	8,8
10	¿Cuántas veces se ha puesto nervioso por los problemas de sus dientes o de su dentadura?	0	8,8	8,8	26,6	55,9
11	¿Cuántas veces no ha comido a gusto delante de otras personas por culpa de sus dientes o dentadura?	0	8,8	8,8	23,5	58,8
12	¿Cuántas veces ha tenido que retirarse sus prótesis por molestias o dolor?	0	8,8	14,7	29,4	47,1

Tabla 4. Porcentaje por pregunta de la encuesta GOHAI después del uso de la PPR						
No.	Pregunta	S	F	AV	RV	N
1	¿Cuántas veces ha tenido que comer menos o cambiar de comida por culpa de sus dientes o de su dentadura?	0	0	0	32,4	67,6
2	¿Cuántas veces ha tenido problemas al masticar comidas como la carne o las manzanas?	0	0	17,6	50,0	32,4
3	¿Cuántas veces ha tragado usted bien?	70,6	26,5	2,9	0	0
4	¿Cuántas veces no ha podido usted hablar bien por culpa de sus dientes o dentadura?	0	0	0	26,5	73,5
5	¿Cuántas veces no ha podido comer las cosas que usted quería sin tener ninguna molestia?	0	0	8,8	29,4	61,8
6	¿Cuántas veces no ha querido salir a la calle o hablar con la gente por culpa de sus dientes o dentadura?	0	0	0	17,6	82,4
7	Cuando usted se mira al espejo, ¿cuántas veces ha estado contento de cómo se ven sus dientes o su dentadura?	70,6	29,4	0	0	0
8	¿Cuántas veces ha tenido que utilizar algún medicamento para aliviar el dolor de sus dientes o las molestias en su boca?	0	0	0	29,4	70,6
9	¿Cuántas veces ha estado preocupado o se ha dado cuenta de que sus dientes o su dentadura no están bien?	0	0	0	47,1	52,9
10	¿Cuántas veces se ha puesto nervioso por los problemas de sus dientes o de su dentadura?	0	0	0	32,4	67,6
11	¿Cuántas veces no ha comido a gusto delante de otras personas por culpa de sus dientes o dentadura?	0	0	0	41,2	58,8
12	¿Cuántas veces ha tenido que retirarse sus prótesis por molestias o dolor?	0	0	2,9	35,3	61,8

En la tabla 4. se realiza el análisis de porcentaje por pregunta de la encuesta de GOHA después del uso de la prótesis parcial removible dando como resultado que en la pregunta 1 el 67,6% contestó que «nunca», en la 2 pregunta el 50,0% contestó «frecuentemente», en la pregunta 3 el 70,6% contestó que «siempre», en la pregunta 4 el 73,5% contestó que «nunca», por lo tanto los pacientes manifestaron sentirse aún más satisfechos en la evaluación de la las dimensiones físicas con el uso de su prótesis parcial removible, así mismo indicaron rara vez tener problemas para masticar comidas como carnes o manzanas.

Los resultados de la pregunta 6 el 82,4% contestó que «nunca», en la pregunta 7 el 70,06% contestó que «siempre», en la

pregunta 9 el 52,9% contestó que «nunca», en la pregunta 10 el 67,6% contestó que «nunca», en la pregunta 11 el 58,8% contestó que «nunca», por lo tanto, no presentan problemas psicosociales, al contrario, manifiestan estar más satisfechos con su apariencia después del uso de la prótesis parcial removible, además afirman no tener preocupación por su salud bucal.

Los resultados en la pregunta 5 el 61,8% contestó que «nunca», en la pregunta 8 el 70,6% contestó que «nunca» y en la pregunta 12 el 61,8% contestó que «nunca», por lo tanto, un muy alto porcentaje de pacientes manifiestan nunca tener molestias o incomodidades con el uso de sus prótesis.

Tabla 5. Nivel de satisfacción de pacientes portadores de PPR según su zona edentula

Zona edentula		N	Media	p
Antes	Monomaxilar	11	46.8182	0.008
	Bimaxilar	23	41.8696	0.006
Después	Monomaxilar	11	50.0909	0.009
	Bimaxilar	23	47.9130	0.014

En la tabla 5. podemos observar el nivel de satisfacción percibido por los pacientes según su zona edentula, donde 11 pacientes monomaxilares antes del uso de la prótesis parcial

removible presentan un muy alto valor de satisfacción (46.81) con una desviación estandar de 1,74 y 23 pacientes bimaxilares tambien se encuentran muy satisfechos (41, 86), pero no tanto como

los monoxilares, presentando una desviación estándar de 1,63.

Después de 6 meses, el nivel de satisfacción de los pacientes portadores de prótesis parcial removible, según su zona edentula, aumentó en los 11 pacientes monoxilares (50,09) con una

Discusión

En el 2018, Campos Camila et al, llevaron a cabo una investigación donde evaluaron el nivel de satisfacción de adultos mayores con Alzheimer, donde resulta que los pacientes tuvieron un alto nivel de satisfacción antes del uso de la PPR y 3 meses después estuvieron aún más satisfechos, coincidiendo con nuestro estudio que da como resultado que los pacientes se encuentran satisfechos antes y más aún después del uso de la PPR, sin embargo, también analizamos el nivel de satisfacción en pacientes portadores de prótesis parcial removible según su edad antes y después, dando como resultado que, a medida que aumenta la edad disminuye el nivel de satisfacción, con un p valor de – 5.147.

Dias Frota De Carvalho et al, investigaron en el año 2018 evaluaron a pacientes mediante la encuesta GOHAI, portadores de PPR monomaxilares; superior e inferior, la mayoría mujeres, usaron la PPR entre 90 días y 226 días, la mayoría de las respuestas fueron «nunca» (55.2%), seguida de «a veces» (29.1%) y «siempre» (15.7%). En las preguntas 1,2,3,4 los pacientes

desviación estándar de 0,77 y los 23 pacientes bimaxilares presentaron un aumento significativo (47,91) con una desviación estándar de 0,80. Se observa una diferencia significativa en el porcentaje de nivel de satisfacción de los pacientes bimaxilares después del uso de protésis parcial removible (0.0014).

demonstraron un muy alto nivel de satisfacción, 6,7,9,10,11 demostraron tener un muy alto nivel de satisfacción, 8 y 12 demostraron tener un muy alto nivel de satisfacción, sin embargo, en la pregunta 5 presentan un alto nivel de satisfacción, por lo cual los pacientes no han presentado dolor, pero a veces no ha podido comer a gusto. En este estudio de igual manera la mayoría de respuestas fueron «nunca». También, en la dimensión física se encuentran muy satisfechos, de la misma forma que en el estudio de De Carvalho existe una leve disminución de satisfacción en la pregunta 3, ya que presenta molestias al masticar comidas como carne o manzana. Así mismo en la dimensión psicosocial y de dolor e incomodidades, los pacientes presentan un muy alto nivel de satisfacción, después del uso de su prótesis parcial removible.

De Carvalho, manifiesta que los pacientes portadores de PPR monoxilares mandibular se encuentran más satisfechos que los potadores de PPR maxilares. En cambio, en el presente estudio tuvimos como resultado que los pacientes monomaxilares se encontraron muy satisfechos antes y después del uso de la PPR aún más. Por

otro lado, los pacientes bimaxilares, también, se encontraron muy satisfechos antes y después pero no tanto como los monomaxilares.

En el 2015, Velástegui Vaca y Salazar Garcé realizaron un estudio utilizando como herramienta la encuesta de GOHAI en 40 pacientes portadores de prótesis totales y prótesis parciales removibles, obteniendo como resultado que la mayoría de los pacientes presentaron un nivel de satisfacción bajo siendo la dimensión psicosocial la que más los afecta, y la dimensión física la que menos los afecta. En este estudio, los pacientes presentan un alto nivel de satisfacción en la dimensión psicosocial antes y después del uso de la prótesis parcial removible, en cuanto a la dimensión física los resultados demuestran que los pacientes tienen un muy alto nivel de satisfacción después del uso de la prótesis parcial removible.

En el 2017, R. Ribeiro et al, investigaron la influencia de la rehabilitación oral con el uso de las prótesis removibles en pacientes adultos mayores con Parkinson y pacientes sin Parkinson en igualdad de condiciones, obteniendo como resultado que, los pacientes sin Parkinson antes del uso de la PPR presentaron un bajo nivel de satisfacción y después del uso de la PPR su nivel de satisfacción aumentó a 38.7. Por otro lado, los pacientes con Parkinson antes del uso de la PPR presentaron un nivel de satisfacción muy bajo con 14.2 en cuanto a problemas de dolor e incomodidad, 11,3 en la dimensión psicosocial, 18.2 en la dimensión física y

después de 2 meses de uso de la PPR demostraron mejoría en su nivel de satisfacción, sin embargo, los pacientes con Parkinson demostraron tener niveles más bajos de satisfacción que los pacientes sin Parkinson después del uso de la PPR. En este estudio, obtuvimos otro punto de visto debido a que las dimensiones físicas, psicológicas y los problemas de dolor de incomodidad se mantuvieron altos, antes y después del uso de la PPR aún más altos, teniendo en cuenta que este estudio fue realizado en pacientes sanos, en un rango de edad de 22 años a 77 años de edad.

En el 2021, Campos Sugio et al, realizaron la encuesta de GOHAI a pacientes dentados y pacientes portadores de prótesis parcial removible en 23 pacientes, 14 de género femenino y 9 de género masculino, dando como resultado que los pacientes con PPR tiene un bajo nivel de satisfacción en todas las dimensiones. Los pacientes dentados no presentaron un impacto significativo. Por lo cual no existe similitudes con el presente estudio ya que obtuvimos que los pacientes de género femenino antes del uso de la PPR demostraron un alto nivel de satisfacción y después aún más alto, los pacientes masculinos después del uso de la PPR se encontraron más satisfechos, sin embargo, no tanto como los pacientes femeninos.

Conclusiones

Los pacientes más jóvenes, portadores de prótesis parcial removible monoxilar, obtuvieron un nivel de satisfacción más alto, antes y después. Por esa razón, las dimensiones físicas, fonéticas, masticatorias, estado emocional, autoestima y dolor influyen en el nivel de satisfacción, pese a ello, el nivel de satisfacción de los pacientes portadores de prótesis parcial removible se encuentra directamente asociado con los factores del paciente como: la edad, el género y la zona edéntula.

Referencias

1. Velástegui Vaca CA Od, Salazar Garcés MT Dra. Rendimiento masticatorio y nivel de satisfacción en adultos ecuatorianos rehabilitados con prótesis parcial y total removible. *Odontología* [Internet]. 2018;5–19. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.29166/20/1/5-19>
2. Yoshimoto, T.; Hasegawa, Y.; Salazar, S.; Kikuchi, S.; Hori, K.; Ono, T. Factors Affecting Masticatory Satisfaction in Patients with Removable Partial Dentures. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2021, 18, 6620. <https://doi.org/10.3390/ijerph18126620>.
3. González Ortiz ÁM, Veintimilla Abril VJ, Villarreal Salazar MS. Nivel de satisfacción del uso de prótesis totales bimaxilares en adultos mayores del Hospital Dr. Humberto Molina de Zaruma entre abril del 2015 y enero del año 2016-2019;3(1):305–28. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.26820/recimundo/3.\(1\).enero.2019.305-328](http://dx.doi.org/10.26820/recimundo/3.(1).enero.2019.305-328)
4. MOYA M. P.; MARQUARDT, K.; ARELLANO, C.; CONTRERAS, C. & GONZÁLEZ, C. Efectos de la prótesis dental en la función masticatoria de adultos mayores. *J. health med. sci.*, 5(1):41-50, 2019
5. Campos, C. H., Ribeiro, G. R., & Rodrigues Garcia, R. C. M. (2018). Mastication and oral health–related quality of life in removable denture wearers with Alzheimer disease. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, 119(5), 764–768. <https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2017.07.010>
6. Ribeiro, G. R., Campos, C. H., & Rodrigues Garcia, R. C. M. (2017). Influence of a removable prosthesis on oral health-related quality of life and mastication in elders with Parkinson disease. *The Journal of Prosthetic Dentistry*. <https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2016.12.018>
7. Campos Sugio, C. Y., Mosquim, V., Jacomine, J. C., Zabeu, G. S., de Espíndola, G. G., Bonjardim, L. R., Bonfante, E. A., & Wang, L. (2022). Impact of rehabilitation with removable complete or partial dentures on masticatory efficiency and quality of life: A cross-sectional mapping study. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, 128(6), 1295–1302. <https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2021.02.035>
8. 1. von Kretschmann San Martin D, Torres Varela A, Sierra Fuentes M, del Pozo Bassi J, Quiroga Aravena R,

- Quiroga del Pozo R. Rendimiento masticatorio y nivel de satisfacción de pacientes tratados con prótesis totales en la Universidad Mayor. *Rev clín periodoncia implantol rehabil oral* [Internet]. 2015;8(1):17–23. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.piro.2014.12.001>
9. Yoshimoto T, Hasegawa Y, Salazar S, Kikuchi S, Horii K, Ono T. Factors affecting masticatory satisfaction in patients with removable partial dentures. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2021;18(12):6620. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18126620>
 10. Comparing oral health-related quality of life (OHIP-14) and masticatory efficiency with complete denture treatment. *J Coll Physicians Surg Pak* [Internet]. 2021;31(6):694–8. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.29271/jcpsp.2021.06.694>
 11. Sánchez-García S, Heredia-Ponce E, Juárez-Cedillo T, Gallegos-Carrillo K, Espinel-Bermúdez C, De La Fuente-Hernández J, et al. Psychometric properties of the General Oral Health Assessment Index (GOHAI) and dental status of an elderly Mexican population: Psychometric properties of the General Oral Health Assessment Index (GOHAI). *J Public Health Dent* [Internet]. 2010;70(4):300–7. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-7325.2010.00187.x>
 12. Valverde Leiva A, Vargas Koudriavtsev T, Fernández López O. Validación de un instrumento para conocer el nivel de satisfacción de pacientes rehabilitados con prótesis removible. *Odvotos - International Journal of Dental Sciences* [Internet]. 2015;17(3):87-94. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=499550303008>
 13. Afrashtehfar KI, Assery MKA, Bryant SR. Patient satisfaction in medicine and dentistry. *Int J Dent* [Internet]. 2020;2020:1–10. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1155/2020/6621848>
 14. Teng, C.J., Lin, S.C., Chen, J.H. et al. The association between denture self-satisfaction rates and OHRQoL - a follow-up study. *BMC Oral Health* 20, 140 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12903-020-01119-1>
 15. Ikebe K, Hazeyama T, Enoki K, Murai S, Okada T, Kagawa R, et al. Comparison of GOHAI

- and OHIP-14 measures in relation to objective values of oral function in elderly Japanese. *Community Dent Oral Epidemiol* [Internet]. 2012;40(5):406–14. Disponible en:
<http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0528.2012.00683.x>
16. Salazar S, Hasegawa Y, Kikuchi S, Kaneda K, Yoneda H, Nokubi T, et al. The impact of a newly constructed removable denture on the objective and subjective masticatory function. *J Prosthodont Res* [Internet]. 2021;65(3):346–52. Disponible en:
<http://dx.doi.org/10.2186/jpr.jprd.20.00045>
17. Allen P. Health Qual Life Outcomes [Internet]. 2003;1(1):40. Disponible en:
<http://dx.doi.org/10.1186/1477-7525-1-40>
18. Atchison KA. The General Oral Health Assessment Index(GOHA). In: Slade GD, editor. *Measuring oral health and quality of life*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina; Dental Ecology; 1997. p. 71-9
19. Pinzón-Pulido SA, Gil-Montoya JA. Validación del índice de Valoración de Salud Oral en Geriátría en una población geriátrica institucionalizada de Granada. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 1999;34:273-82
20. Pinzón-Pulido SA, Gil-Montoya JA. Validación del índice de Valoración de Salud Oral en Geriátría en una población geriátrica institucionalizada de Granada. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 1999;34:273-82



DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Valarezo Orellana, Tábata Paulette** con C.C: # 0706022456 autora del trabajo de titulación: **Nivel de satisfacción en pacientes portadores de prótesis parcial removible** previo a la obtención del título de **Odontóloga** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, 11 de septiembre de 2024

Tábata Valarezo

f. _____

Nombre: **Valarezo Orellana, Tábata Paulette**
C.C: **0706022456**

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA Y SUBTEMA:	Nivel de satisfacción en pacientes portadores de prótesis parcial removible		
AUTOR(ES)	Valarezo Orellana, Tábata Paulette		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Ocampo Poma, Estefanía del Rocío		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Facultad de ciencias de la salud		
CARRERA:	Odontología		
TITULO OBTENIDO:	Odontóloga		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	11 de septiembre de 2024	No. DE PÁGINAS:	12
ÁREAS TEMÁTICAS:	Rehabilitación, edentulismo, Cirugía ortognática bimaxilar y monomaxilar		
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:	Nivel de satisfacción, prótesis parcial removible, dimensión física, fonética, problemas psicosociales, dolor, monoxilar		
<p>Las prótesis parciales removibles son tratamientos específicos que sirven para la rehabilitación de pacientes con edentulismo parcial, estas pueden ocasionar dolor, problemas psicosociales, disminución de la función masticatoria y fonética generando el rechazo de los pacientes. El nivel de satisfacción se refiere al nivel de complacencia de pacientes portadores de prótesis dental y se encuentra asociado a la capacidad del paciente para adaptarse a la prótesis dental. Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción en pacientes portadores de prótesis parcial removible en la clínica odontológica de la UCSG periodo A-2024. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo cuali-cuantitativa, de diseño no experimental, longitudinal y descriptivo, con una muestra de 34 pacientes portadores de prótesis parcial removible bimaxilar o monomaxilar, en un rango de edad de 20 años a 75 años, tanto de género masculino y femenino antes del uso de la PPR y 6 meses después del uso de la PPR. La encuesta de GOHAI fue el instrumento utilizado para determinar el nivel de satisfacción, donde evalúa las dimensiones: físicas, fonéticas, psicosociales y problemas de dolor e incomodidad en sus 12 preguntas, las cuales fueron medidas por el índice tipo Likert. Resultados: Los pacientes más jóvenes portadores de PPR monomaxilares, obtuvieron un nivel de satisfacción alto antes y después.</p> <p>Conclusiones: Los pacientes antes del uso de la PPR resultaron tener un nivel de satisfacción alto, después de los 6 meses del uso de la PPR resultaron tener un nivel de satisfacción muy alto.</p>			
ADJUNTO PDF:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: 0996577067	Email: Tabata_valarezo@hotmail.com	
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::	Nombre: Ocampo Poma Estefanía del Rocío		
	Teléfono: +593996757081		
	E-mail: estefania.ocampo@cu.ucsg.edu.ec		
SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA			
Nº. DE REGISTRO (en base a datos):			
Nº. DE CLASIFICACIÓN:			
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):			